

## **PRZYGOTOWANIE DO BADANIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA**

Do badania należy się zgłosić na czczo (około 6 godzin od ostatniego posiłku). W niektórych przypadkach dla uzyskania odpowiedniego diagnostycznie obrazu konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego, który może wywołać reakcję alergiczną lub działania niepożądane.

### **Najczęstsze działania niepożądane to:**

- nudności i wymioty
- uczucie gorąca
- świąd lub zaczerwienienie skóry
- pokrzywka
- bóle naczyniowe
- chrypka
- kaszel
- kichanie
- niepokój
- bóle brzucha lub klatki piersiowej
- kołatanie serca
- obrzęk twarzy
- potliwość

Badanie TK trwa około 15 minut, w tym czasie Pacjent poddawany jest kilkukrotnemu działaniu promieniowania jonizującego (RTG).

Pacjentki karmiące piersią po badaniu nie powinny karmić co najmniej przez następne 24 godziny po badaniu.

Do badania wymagane są wszystkie wcześniej wykonane zdjęcia RTG, Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego i USG wraz z opisami oraz karty informacyjne z prowadzonego leczenia.

### **UWAGA!**

#### **BEZWZGLĘDNYM PRZECIWWSKAZANIEM do wykonania badania TK jest ciąża.**

W przypadku schorzeń w obrębie tarczycy, astmy oskrzelowej, alergii, paraproteinemii (szpiczak, choroba Waldenstroma), niewydolności układu krążenia lub układu oddechowego, niewydolności nerek lub wątroby **PRZED BADANIEM KONIECZNA JEST KONSULTACJA Z LEKARZEM RADIOLOGIEM**. Pacjent zobowiązany jest do dostarczenia wyników badań potwierdzających możliwość przeprowadzenia badania TK. W przypadku jakiegokolwiek choroby tarczycy konieczne jest dostarczenie najnowszych (sprzed tygodnia) wyników TSH, T3, T4. Wskazane jest także zaświadczenie od endokrynologa o braku przeciwwskazań do wykonania badania TK i podania środka kontrastowego. W przypadku występowania u pacjenta cukrzycy, powinien odstawić leki typu biguanidy: Metformax, Metformin, Siofor, Formetic, Glucophage, Gluformin, Metfogamma, Metifor na 48 godz. przed badaniem.